

**BIOSTYMULATOR BISTERAN DO
STOSOWANIA DOLISTNEGO**

**ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY OZDOBNÉ**

Skutek opryskiwania: poprawa cech jakościowych,
zwiększenie odporności na stres

Opryskiwanie roślin: Zalecane stężenie: 0,05% (5 ml środka
na 10 l wody). Opryskiwać rośliny po rozpoczęciu wegetacji
kilkukrotnie w odstępach tygodniowych.

WARZYWA

Skutek opryskiwania: poprawa wigoru roślin, lepsze rozkrzewianie,
zwiększenie plonu, zwiększenie odporności na stres

Warzywa w miejscu stałym: Zalecane stężenie: 0,01-0,05%
(50-250ml/ha w dawce wody 500 l/ha). Opryskiwać
rośliny co 10-14 dni po posadzeniu na miejsce stałe.

ROŚLINY SADOWNICZE

Skutek opryskiwania: poprawa wigoru roślin, zwiększenie
„odporności na stres, lepsze rozkrzewianie”

W sadach i plantacjach: Stosować w stężeniu 0,1 - 0,2%
(100 - 200 ml środka na 100 l wody). Należy wykonać trzy
opryski w sezonie wegetacyjnym. Pierwszy zabieg wykonać,
gdy pojawiają się pierwsze, w pełni wyrośnięte liście,
a następne w odstępach 10-14 dni.

W PRZYPADKU USZKODZENIA DRZEW W SADACH

Skutek opryskiwania: szybsza regeneracja tkanki ochronnej drzew
w sadach, poprawa kondycji i wigoru drzew, zwiększenie odporności
na stres

Wykonać trzy opryski w stężeniu 0,05% (50 ml środka na
100 l wody). Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po
powstaniu uszkodzeń, a następne w odstępach 10 - 14 dni.

Nie mieszać z innymi stymulatorami i nawozami.

Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.



UN 2014



1kg